

带状疱疹ワクチン 比較表



<带状疱疹ワクチンは2種類あります>



	生ワクチン（ビケン）	不活化ワクチン（シングリックス）
接種方法	皮下注射	筋肉注射
接種回数	1回	2回（2ヶ月後に2回） 2回目は遅くとも6ヶ月後までに接種
予防効果	50～59歳：69.8% 60～69歳：64% 70～79歳：41% 80歳以上：18%	50～59歳：96.6% 60～69歳：97.4% 70～79歳：91.3% 80歳以上：91.4%
持続期間	3～5年程度	10年以上
副反応	接種部位の痛み 腫れ、発赤 3日～1週間で消失	接種部位の痛み、腫れ、発赤 筋肉痛、全身倦怠感 3日～1週間で消失
料金	7340円	22000円 × 2回
長所	<ul style="list-style-type: none"> ・1回で済む ・値段が安い 	<ul style="list-style-type: none"> ・带状疱疹後神経痛の発症が極めて少ない ・免疫が低下している方にも接種できる ・予防効果が高い ・持続期間が長い

保険外診療のため全額負担となります。

ご希望の方は予約が必要です。

詳しくは、主治医か受付窓口にご相談下さい。

仙台すこやかクリニック

022-219-0052